SprayBor

Sodium Borate 16.5% Boron /
Borate de Sodium 16,5% de Bore

Sodium Borate (Water Soluble)
Guaranteed Analysis: Boron (B) (actual) 16.5%

For Correction of Boron Deficiencies

Caution: This fertilizer contains Boron, and should be used only as recommended. It may prove harmful if misused.
Note: SprayBor should be used on the basis of a soil and/or tissue analysis.
Directions for Use: For use in balanced fertilizer programs for those crops requiring boron, e.g. apples, alfalfa, corn, flowers, grapes, onions, potatoes, sunflower and cole crops. Do not spray less than 2,000 litres of water per hectare on apples.
Do not exceed a concentration of more than 5% (aerial application/low water volume) or when spray water is excessively cold.

Foliar Application:
Apples: 2.0 kg/ha, (0.8 kg/acre). Apply at the rate of 1 kg SprayBor per 1,000 litres of water. Apply no less than 2,000L per application. Apply at the start of flowering and repeat 10-14 days later.
Alfalfa: 0.3 – 0.5 kg/ha. (0.12 – 0.2 kg/acre) in a maximum of 2,000L/ha . Apply as a maintenance overall spray treatment 5 days after each cutting. Use the lower rate for sandy soils and the higher rate for clay soils. Do not exceed 0.5 kg per hectare.
Cole Crops: 0.75 kg/ha, (0.3 kg/acre). Dilute in 450L of water/ha. Commence spraying when young plants are ∀8 cm. high. Repeat after 10 – 14 days.
Potatoes: 0.1 – 0.3 (100-300 g) kg/ha.(0.04 – 0.12 (40-120 g) kg/acre). Dilute in 450L of water/ha. Apply 3 sprays at 3 weekly intervals.
Sunflowers: 0.75 kg/ha. (0.3 kg/acre). Dilute in 450L of water/ha. Apply as a full cover spray and repeat after formation of new leaves.
Onions: 0.75 kg/ha. (0.3 kg/acre). Dilute in 250L of water/ha. Apply first spray 3 weeks after plants are established and repeat 3 weeks after first spray.
Corn: 0.1 – 0.3 kg/ha. (0.04 – 0.12 kg/acre). Dilute in 250L of water/ha. Commence spraying when plants reach knee height and repeat if necessary 14 days later. Use lower dosage rates on younger plants.
Grapes: 2 (1 kg in 1,000 litres water) kg/ha. (0.8 kg/acre). Dilute 2 kg of product in 2,000L of water/ha. Apply 2 sprays. Commence spraying mid-July and repeat 10-14 days later.
Flowers and Ornamentals: 1 kg/ha (1 kg per 1,000 litres (100 g / 100 litres). (40 g/100 litres per acre). Dilute in1,000L of water/ha. Apply 2 – 3 sprays at monthly intervals, during the growing season. Start spraying as soon as plants are fully established.
Recommendation:
The user should seek the advice of the county agricultural representative or a professional agriculture consultant.
Notice to Buyer:
Seller's guarantee shall be limited to the terms set out on the label and subject thereto, the buyer assumes the risk to persons or property arising from the user or handling of this product and accepts the product on that condition.
Registration Number: 940006B Fertilizers Act

RISK PHRASES:
- Product is non-flammable.
- Mild eye and skin irritant.

PRECAUTIONARY MEASURES:
- Stable under normal storage conditions.
- Keep away from strong oxidizing agents and acids.
- Wear rubber or impervious gloves when handling the product.
- Wear MSHA/NIOSH approved mask, goggles, standard workgear (protective clothing) when handling the product.

FIRST AID MEASURES:
- Flush affected eyes with running water for 15 minutes.
- Remove contaminated clothing, launder clothing before re-use
- Wash affected skin areas with soap and water.
- Seek medical advice when swallowed.

Refer to Material Safety Data Sheet for further information.
Shake well before use. Keep from freezing

Borate de Sodium (Soluble dans L'Eau)
Analyse Garantie: Bore (B) (Réel) 16.5%

Pour Corriger les Carences en Bore

Avertissement: Cet engrais renferme du bore et ne doit être employé que de la manière recommandée. It peut être nocif s'il est employé mal à propos.
Note: L'application du **SprayBor** devrait se faire sur la base des analyses de sol et/ou de tissu.
Mode d'Emploi: Engrais contenent du bore, utiliser avec un programme de fertilisation balancé sur les récoltes de pommes, luzerne, mais, fleurs, vignes, oignons, pommes de terre, tournesol et crucifére.
Ne pas appliquer dans moins de 2,000 litres d'eau par hectare sur pommes.
N'excédez pas une concentration de plus de 5% (application aérienne/faible volume d'eau) ou quand l'eau de pulvérisation est excessivement froide.
Application foliaire:
Pommes: 2.0 kg/ha, (0.8 kg/acre). Appliquer à raison de 1 kg par 1,000 litres d'eau. Ne pas appliquer moins de 2,000L par application. Appliquer dès le début de la floraison et répéter à intervalle de 10-14 jours.
Luzerne: 0.3 – 0.5 kg/ha. (0.12 – 0.2 kg/acre) dans un maximum de 2,000L d'eau/ha. Appliquer 5 jours après chaque coupe. Utiliser le taux le plus bas pour les sols sableux et le plus élevé pour les sols argileux. Ne pas excéder 0.5 kg par hectare.
Crucifére: 0.75 kg/ha. (0.3 kg/acre). Diluez dans 450L d'eau/ha. Commencer à arroser lorsque les jeunes plants ont atteint ∀8 cm de haut. Répéter à intervalle de 10-14 jours.
Pommes de terre: 0.1 – 0.3 (100-300 g) kg/ha. (0.04 – 0.12 (40-120 g) kg/acre). Diluez dans 450L d'eau/ha. Appliquer 3 fois à 3 semaines d'intervalle.
Tournesol: 0.75 kg/ha. (0.3 kg/acre). Diluez dans 450L d'eau/ha. Appliquer afin de couvrir toute la plante et répéter à la formation de nouvelles feuilles.
Oignons: 0.75 kg/ha. (0.3 kg/acre). Diluez dans 250L d'eau/ha. Faire une première application, 3 semaines après que les plants solent établis et répéter 3 semaines plus tard.
Maïs: 0.1 – 0.3 kg/ha.(0.04 – 0.12 kg/acre). Diluez dans 450L d'eau/ha. Commencez l'arrosage losque les plantes ont atteintes la hauteur des genoux, et répétez au besoin 14 jours plus tard. Sur les jeunes plants utiliser le taux moin élevé.
Vignes: 2 (1 kg in 1,000 litres d'eau) kg/ha. (0.8 kg/acre). Diluez 2kg de produit dans 2,000L d'eau/ha. Appliquer 2 fois. Commencer à la mi juillet et répéter 10-14 jours plus tard.
Fleurs et Ornementaux: 1 kg/ha (1 kg per 1,000 litres d'eau (100 g / 100 litres). (40 g/100 litres par acre). Diluez dans 1,000L d'eau/ha. Appliquer 2 – 3 fois, à intervalle mensuel, durant la saison de croissance. Commencer l'aplication dès que les plants sont établis.
Recommendation:
L'utilisateur devrait demander l'avis d'un conseiller agricole régional ou d'un spécialiste agricole.
Note à l'Acheteur:
La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette, de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manutention du produit peuvent entraîner, et accepte celui-ci à cette condition.
Numero d'enregistrement: 940006B Loi Sur Les Engrais

RISQUES:
- Produit inflammable.
- Faible irritant pour les yeux et la peau.

MESURES DE PRÉCAUTION:
- La produit demeure stable s'il est entreposé sous des conditions normales.
- Éviter tout contact avec des agents oxidants et des acides forts.
- Lors de la manipulation du produit porter des gants de caoutchouc ou imperméables.
- Lors de la manipulation du produit, porter un masque et des lunettes de sécurité approuvés par MSHA/NIOSH et des survêtements protecteurs.

PREMIERS SOINS:
- Rinçer les yeux sous l'eau courante pendant 15 minutes.
- Romeve contaminated clothing des vêtements avant la reutilisation.
- Laver les parties de la peau exposées avec de l'eau et du savon.
- Consulter un médecin si avalé

Pour plus d'information, veuillez consulter la fiche signalétique.
Bien secouer avant l'utilisation. Protége contre le gel.

NET CONTENTS / CONTENU NET: 25 kg

Batch No./Numéro de Lot: 060711-7